

Respostas aos Recursos – MÉDIO ADMINISTRATIVO MANHÃ – T04 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta alterada para:
26-1	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>(A) Administrar aspirina imediatamente se não houver contraindicações conhecidas.</p> <p>Correta. A administração de aspirina durante um ataque cardíaco é recomendada porque o medicamento pode ajudar a impedir a formação de coágulos sanguíneos, o que pode melhorar o fluxo sanguíneo para o coração. No entanto, é essencial garantir que a pessoa não tenha alergia ou outras contraindicações ao uso de aspirina.</p> <p>(B) Encorajar a pessoa a tossir pausadamente se ela estiver sozinha e achar que está sofrendo um ataque cardíaco.</p> <p>Incorreta. A manobra de tossir repetidamente para tentar reverter um ataque cardíaco (conhecida como "tosse cardíaca") não é recomendada e não é uma prática reconhecida ou apoiada por diretrizes médicas. Essa técnica pode causar mais danos e não deve ser incentivada.</p> <p>(C) Posicionar a pessoa em pé para aumentar o fluxo de sangue para o coração.</p> <p>Incorreta. Durante um ataque cardíaco, a pessoa deve ser mantida sentada ou deitada com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados. Isso ajuda a reduzir a carga sobre o coração e facilita a respiração. Colocar a pessoa em pé pode aumentar a demanda de oxigênio pelo coração e agravar a situação.</p> <p>(D) Manter a pessoa fazendo algum tipo de atividade física leve.</p> <p>Incorreta. Durante um ataque cardíaco, é crucial que a pessoa fique em repouso. Atividade física,</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	<p>mesmo que leve, pode aumentar a carga sobre o coração e agravar o quadro clínico. O repouso é necessário para minimizar o esforço do coração.</p> <p>(E) Usar desfibrilador interno automático (DIA) se disponível e se a pessoa estiver consciente.</p> <p>Incorreta. O desfibrilador externo automático (DEA) é usado em casos de parada cardíaca súbita e é projetado para ser usado em uma pessoa inconsciente e sem pulso. Se a pessoa estiver consciente, um DEA não é apropriado, pois ela ainda tem um ritmo cardíaco, mesmo que irregular ou anormal. Além disso, um DIA (desfibrilador interno automático) é um dispositivo implantado cirurgicamente, não utilizado em primeiros socorros.</p> <p>Portanto, a única opção correta é a (A), que é administrar aspirina se não houver contraindicações conhecidas.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>		
28-1	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>A questão está em consonância com o seguinte ponto do conteúdo programático previsto no edital: “Dose, efeito e resposta e relações dose-efeito e dose-resposta.”</p> <p>Verdadeiro: A dose mínima efetiva é, de fato, a menor quantidade de um agente que causa uma resposta detectável em um indivíduo. Isso é uma definição padrão em toxicologia e farmacologia.</p> <p>Falso: A relação dose-resposta linear não sugere que aumentos iguais na dose sempre resultarão em aumentos iguais na resposta. Muitas vezes, a resposta não é linear e pode mostrar uma curva de saturação ou outros tipos de relação não linear.</p> <p>Falso: Doses subletais de uma substância tóxica podem sim causar efeitos adversos, mesmo que sejam administradas abaixo de um certo limiar. Existem muitos exemplos onde doses baixas, ainda que não letais, podem ter efeitos crônicos ou acumulativos ao longo do tempo.</p> <p>Assim, a sequência correta é: (D) 1.V, 2.F, 3.F.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido