

## RESPOSTAS AOS RECURSOS – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
B01_1-45 / B01_2-47 / B01_3-52	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Frase I: "A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos."</p> <p>Correta. A Lei 8.142/1990, em seu Art. 1º, § 2º, estabelece que a representação dos usuários deve ser paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.</p> <p>Frase II: "Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como receitas de custeio e de capital do Ministério do Planejamento, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta."</p> <p>Incorreta. A alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) deve ser destinada ao custeio e investimento das ações e serviços de saúde, e não ao Ministério do Planejamento. A Lei 8.142/1990, Art. 2º, § 1º, determina que os recursos são transferidos diretamente ao Fundo de Saúde de cada esfera de governo.</p> <p>Frase III: "O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde."</p> <p>Correta. A Lei 8.142/1990, em seu Art. 1º, § 1º, estabelece que o SUS contará com as instâncias colegiadas Conferência de Saúde e Conselho de Saúde em cada esfera de governo.</p> <p>Conclusão</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	<p>Analisando as proposições, constatamos que estão corretas apenas as frases I e III. Assim, a alternativa correta é:</p> <p>(B) Apenas, I e III.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>		
B01_1-55 / B01_2-42 / B01_3-51	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), o conceito que se refere a uma forma de articulação de recursos e práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção de uma dada região de saúde, para a condução oportuna, ágil e singular dos usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às necessidades epidemiológicas de maior relevância é:</p> <p>(E) Linhas de Cuidado (LC)</p> <p>As Linhas de Cuidado (LC) organizam e integram os serviços de saúde em torno de um percurso assistencial centrado no usuário, garantindo que ele tenha acesso ao diagnóstico e tratamento necessários de forma oportuna e adequada, conforme as diretrizes clínicas estabelecidas para suas condições de saúde.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>	Indeferido	Gabarito mantido
B01_1-63 / B01_2-51 / B01_3-49	<p>Em resposta à fundamentação do candidato, após análise desta banca conclui-se que o recurso não assiste ao recorrente, devido aos fatos apresentados abaixo:</p> <p>Alternativa A:</p>	Indeferido	Gabarito mantido

	<p>"A vacina Tríplice Viral (SCR) deve ser administrada em duas doses para todas as faixas etárias adultas, sem necessidade de verificar a situação vacinal anterior."</p> <p>Incorreta. A vacina Tríplice Viral (SCR) é indicada para adultos que não tenham comprovação de vacinação prévia. A necessidade de duas doses varia conforme a situação vacinal anterior e a faixa etária.</p> <p>Alternativa B:</p> <p>"A vacina Pneumocócica 23-valente (VPP 23) é recomendada para todos os adultos a partir dos 50 anos, com uma dose de reforço a cada 10 anos."</p> <p>Incorreta. A vacina Pneumocócica 23-valente (VPP 23) é indicada principalmente para idosos acima de 60 anos e pessoas com condições de risco específicas. O reforço a cada 10 anos não é uma recomendação padrão para todos os adultos a partir dos 50 anos.</p> <p>Alternativa C:</p> <p>"A vacina contra Febre Amarela (VFA) deve ser administrada em duas doses, sendo a segunda dose aplicada 5 anos após a primeira, independentemente da idade da pessoa ao receber a primeira dose."</p> <p>Incorreta. Atualmente, a recomendação é de apenas uma dose da vacina contra Febre Amarela para ser considerada proteção ao longo da vida. A segunda dose é indicada apenas em situações específicas.</p> <p>Alternativa D:</p> <p>"A vacina dT (Difteria e Tétano) deve ser administrada em três doses, com reforço recomendado a cada 10 anos, reduzindo-se este intervalo para 5 anos em caso de ferimentos graves."</p> <p>Correta. A vacina dT (Difteria e Tétano) é recomendada em um esquema de três doses para adultos que não foram vacinados anteriormente, com reforços a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, o intervalo entre os reforços deve ser reduzido para 5 anos.</p>		
--	---	--	--

	<p>Alternativa E:</p> <p>"A vacina contra Hepatite B (HB) deve ser administrada em três doses, com a segunda dose sendo aplicada 2 meses após a primeira, e a terceira dose 4 meses após a primeira."</p> <p>Incorreta. O esquema de vacinação contra Hepatite B é de três doses, mas o intervalo recomendado é de 1 mês entre a primeira e a segunda dose, e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose.</p> <p>Portanto, a alternativa correta é:</p> <p>(D) A vacina dT (Difteria e Tétano) deve ser administrada em três doses, com reforço recomendado a cada 10 anos, reduzindo-se este intervalo para 5 anos em caso de ferimentos graves.</p> <p>Diante dos argumentos apresentados pela banca, RECURSO INDEFERIDO.</p>		
--	--	--	--