



DR. RODRIGO LAMOUNIER | CRM MG 31293

hypo
talks

Vamos falar sobre hipoglicemia?

Prevalência da hipoglicemia no Brasil¹

HIPOGLICEMIA
É UM PROBLEMA GRAVE
E MUITO COMUM NO BRASIL¹

ESTUDO HAT Brasil¹

Período prospectivo
de 4 semanas



Pacientes que
relataram
hipoglicemia

DM1¹

92%

DM2¹

62%



Pacientes que
relataram
**hipoglicemia
noturna**

55%

27%



Pacientes que
relataram
**hipoglicemia
grave**

26%

13%

**A HIPOGLICEMIA
TEM CONSEQUÊNCIAS IMPORTANTES
NO CURTO E NO LONGO PRAZO¹:**

~60%

**aumentaram a ingestão
calórica**, que pode levar ao
ganho de peso.

~30%

**relataram omissão ou redução
das doses de insulina** por conta
de episódios prévios.



Pacientes aumentaram a monitorização de glicose,
o que pode levar a um **maior custo de tratamento**.

**CONFIRA O CONTEÚDO
NA ÍNTEGRA**

CLICANDO AQUI



Referência: 1. Lamounier RN, et al. Hypoglycemia incidence and awareness among insulin-treated patients with diabetes: the HAT study in Brazil. Diabetol Metab Syndr. 2018;10:83.

Este material é um resumo do vídeo que pode ser acessado na íntegra pelo link www.hypotalks.com.br. O conteúdo do vídeo e deste infográfico possui caráter meramente educacional e reflete a opinião dos especialistas e suas práticas médicas em resposta aos temas sugeridos pela Novo Nordisk®.

Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.
© Marca Registrada Novo Nordisk A/S.
© 2019 Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil Ltda.
Disk Novo Nordisk: 0800 1444 88 | www.novonordisk.com.br
BR20TSM00013 - Fevereiro/2020.

Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.

