












Dr Carlos Eduardo Barra
Couri

Estudo GRADE: Qual a melhor combinação com metformina

Estudo GRADE




*Metformin IR or ER, participant preference

Estudo GRADE

~~ISGLT2~~

~~PIOGLITAZONA~~



*Metformin IR or ER, participant preference

Estudo GRADE - $n = 5.047$

Característica	
Idade	57,2 anos
Masculino	63,2 %
Raça branca	65,7 %
Duração do DM2	4,2 anos
Dose média de MET	2g
IAM ou AVC	6,5 %
Retinopatia	1 %
Neuropatia	21,5 %
HAS	66,6 %
Dislipidemia	72,2 %
IMC	34,3 Kg/m ²

Estudo GRADE - $n = 5.047$

Característica	
Idade	57,2 anos
Masculino	63,2 %
Raça branca	65,7 %
Duração do DM2	4,2 anos
Dose média de MET	2g
IAM ou AVC	6,5 %
Retinopatia	1 %
Neuropatia	21,5 %
HAS	66,6 %
Dislipidemia	72,2 %
IMC	34,3 Kg/m ²

Característica	
PAS	128 mmHg
PAD	77,3 mmHg
PA < 140/90	75 %
A1C	7,5 %
A1C < 7 %	14,4%
LDL-c	90,5 mg/dl
HDL-c	43,4 mg/dl
TG	154 mg/dl
GJ	151,5 mg/dl
TGF	95,3 ml/min
TFG < 60 ml/min	2,4%

Estudo GRADE


Participants could use metformin IR or ER.

Metformin dose at screening $\pm$ SD	1576 $\pm$ 525 mg/day
Metformin dose at baseline $\pm$ SD	1944 $\pm$ 205 mg/day


No significant differences among treatment groups

Adesão aos medicamentos

Permanently discontinued
assigned medication




Used non-study, off-protocol
glucose-lowering medications




$p < 0.001$

$p = 0.003$


Evolução da A1C




Evolução da A1C



Liraglutida x outras medicações




Liraglutida x outras medicações



Liraglutida x outras medicações


Qualquer evento CV

Any CVD: MACE, Hospitalized HF, Unstable Angina, TIA or Revascularization




Hipoglicemia necessitando de assistência

Percentage of participants who developed severe hypoglycemia



$p=0.003$

Evolução de peso



**Os resultados do estudo GRADE
mudarão a sua conduta diária?**



OBRIGADO !

Para acessar materiais complementares
ligados
a esta apresentação basta escanear

